



# ASPIRINE® 100

tablet 100 mg acetylsalicylzuur (acetosal)

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten gewijzigd zijn.

## Naam en adres van de vergunninghouder

Bayer B.V.  
Energieweg 1  
3641 RT Mijdrecht  
Tel. 0297-280666

## Naam van de fabrikant

Bayer AG, Duitsland

## Naam van het geneesmiddel

Aspirine 100

## Samenstelling

Per tablet 100 mg acetylsalicylzuur (acetosal). De tabletten zijn wit en aan de ene kant voorzien van de opdruk DC en aan de andere kant van een Bayer-kruis.

## Werking

- pijnstillend
- koortsverlagend
- ontstekingsremmend.

## Waarvoor wordt Aspirine 100 gebruikt?

Aspirine 100 kan worden gebruikt bij:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid
- koorts en pijn na vaccinatie
- hoofdpijn
- kiespijn
- zenuwpijn
- spierpijn
- reumatische pijn.

## Wanneer mag Aspirine 100 niet worden gebruikt?

Aspirine 100 mag niet worden gebruikt door:

- maagpatiënten die bij eerder gebruik maagpijn kregen
- patiënten met een maag-/darmzweer
- patiënten met maag-/darmbloedingen
- patiënten die overgevoelig zijn voor salicylzuurverbindingen of andere soortgelijke pijnstillers (bv. sommige astmapatiënten; deze kunnen een aanval krijgen of flauwvallen)
- patiënten met leveraandoeningen
- patiënten met ernstige nierklachten
- patiënten met neiging tot bloeden of stollingsstoornissen (zoals hemofilie en hypotrombinemie)
- patiënten die met antistollingsmiddelen worden behandeld.

## Bijwerkingen

Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:

- maagklachten (dan gebruik stoppen)
- bloedverlies in het maagdarmkanaal (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar); bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede
- overgevoeligheidsverschijnselen
- verlenging van de bloedingstijd.

## Waarschuwingen en voorzorgen

Veelvuldig gebruik wordt ontraden. Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen. Gebruik geen acetylsalicylzuur vóór of na het trekken van tanden of kiezen. Bij kinderen met waterpokken of griep mag acetylsalicylzuur alleen op advies van de arts worden toegepast.

### Waarop moet u letten als u gelijktijdig een ander (genees)middel gebruikt?

Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en antistollingsmiddelen (bloedverdunnende middelen) kan de neiging tot bloeden toenemen. Bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur en alcohol wordt de kans op maagklachten groter.

### Dosering

kinderen van 3-6 jaar:

1-2 tabletten per keer, maximaal 7-8 tabletten (= 700-800 mg) per 24 uur, verdeeld over 4-6 giften

kinderen van 7-9 jaar:

2 tabletten per keer, maximaal 10-12 tabletten (= 1000-1200 mg) per 24 uur, verdeeld over 4-6 giften

kinderen van 10-11 jaar:

2-3 tabletten per keer, maximaal 15 tabletten (= 1500 mg) per 24 uur, verdeeld over 4-6 giften.

De tijd tussen twee innames moet bij kinderen minstens 4 uur bedragen. De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de desbetreffende leeftijdscategorie. Bij kinderen tot 4 jaar wordt toediening gedurende meer dan 2 dagen ontraden.

Voor kinderen van 12 jaar en ouder wordt verwezen naar Aspirine, tabletten van 500 mg.

Wanneer de klachten (koorts en pijn) weer opkomen, is herhaalde toediening toegestaan, maar de maximale dosering (kinderen 3-6 jaar: 700-800 mg per dag; kinderen 7-9 jaar: 1000-1200 mg per dag en kinderen 10-11 jaar: 1500 mg per dag) mag niet worden overschreden.

### Aanwijzingen voor het gebruik

De tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen; goed omroeren en opdrinken. Bij kleine kinderen de tabletten fijngemaakt met vloeistof toedienen; eventueel water laten nadrinken. Indien een snel effect gewenst is, verdient toediening op de nuchtere maag, of tenminste een half uur vóór de maaltijd de voorkeur.

Wanneer maagklachten optreden, dienen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd te worden ingenomen.

### Wat te doen bij overdosering?

Bij een matige overdosering treden op: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, overgeven en maagpijn.

Bij een ernstige overdosering treden op: hyperventilatie, transpireren, oorsuizen, onrust, hallucinaties en spierkrampen; in zeer ernstige gevallen treedt bewusteloosheid op en kan ademstilstand ontstaan. Indien een te hoge dosis is ingenomen en er zich tekenen van overdosering voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd. Deze oordeelt of ziekenhuisopname noodzakelijk is.

### Aanwijzingen voor het bewaren

Aspirine 100 dient in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15 °C - 25 °C) te worden bewaard; niet in een vochtige omgeving (badkamer!).

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld (achter: 'Niet te gebruiken na:') en op de doordrukstrip (achter de afkorting EXP).

Houdt geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen!

### Verpakking

Aspirine 100 is verkrijgbaar in verpakkingen met 20 tabletten à 100 mg in 2 doordrukstrips à 10 tabletten.

### RVG-nummer

Aspirine 100 is in het register ingeschreven onder RVG 01414.

Augustus 1994

Bayer